







BUFO – Différencier le Crapaud vert (*Bufo viridis*) et le Crapaud calamite (*Epidalea calamita*)

Crapaud vert (<i>Bufo viridis</i>)	Crapaud calamite (<i>Epidalea calamita</i>)
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Marbrures vertes sur fond gris clair (les mâles sont moins contrastés que les femelles). 2. Glandes parotoïdes quasi parallèles et allongées (au moins 2 fois plus longues que larges). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marbrures verdâtres, brunâtres plus ou moins tachées de vert. 2. Glandes parotoïdes courtes et ovales, à peine plus longues que larges. 3. Ligne médiodorsale jaune.
	
<ul style="list-style-type: none"> • Ponte constituée d'œufs noir uniforme agencés en 2 cordons gélatineux de 2 à 4 m de long, le plus souvent enroulés autour de supports immergés. • Œufs disposés en 1 à 4 rangées dans chaque cordon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponte constituée d'œufs noir uniforme agencés en 2 cordons gélatineux de 1 à 2 m de long et souvent déposés à même le fond. • Œufs disposés en 1 à 2 rangées dans chaque cordon.

BUFO– Différencier le Crapaud vert (*Bufo viridis*) et le Crapaud calamite (*Epidalea calamita*)

Crapaud vert (<i>Bufo viridis</i>)	Crapaud calamite (<i>Epidalea calamita</i>)
	
<ul style="list-style-type: none">• Têtards de couleur brun foncé <ol style="list-style-type: none">1. Position des yeux rapprochés chez les 2 espèces	<ul style="list-style-type: none">• Têtards de couleur noire <ol style="list-style-type: none">1. Ligne médiodorsale jaune à un stade avancé